




# AfterAbortion.org

המאמר המקורי באנגלית בכתובת


<https://www.afterabortion.org/each-abortion-increases-womans-risk-of-premature-death-by-50-new-study-reports/>



כל הפלה מגדילה את הסיכון של  
אישה למוות בטרם עת ב-50%,  
דוחות מחקר חדש

הפלה חוקית תורמת - (בנובמבר, 2017) Springfield, IL  
 לעלייה בסיכון של חמישים אחוז למוות בטרם עת בנשים, על פי  
 סקירה שיטתית חדשה שבדקה 989 מחקרים על מקרי מוות  
 הקשורים לתוצאות ההריון

## Mortality Rate Following Delivery or Abortion During First 180 Days and Each Following Year




איור 1: שיעורי התמותה גבוהים יותר לאחר הפלה שמתחילה  
 ב-180 הימים הראשונים ונמשכת לפחות עשר שנים

במהלך 180 הימים הראשונים, הסיכון למוות מכל סיבה שהיא  
 גבוהה פי שניים לאחר הפלה בהשוואה לזה שלאחר הלידה.  
 הסיכון למוות מוקדם נשאר מוגבר במשך עשר שנים לפחות (איור  
 1).

גם הפלה וגם הפלה קשורות לשיעורי תמותה גבוהים, אבל  
 ההשפעה קשורה יותר להפלות יזומות

החלק הגדול ביותר של מקרי מוות בטרם עת בעקבות אובדן הריון נובע מהתאבדויות, תאונות, רציחות ומסיבות טבעיות מסוימות, כגון מחלות במחזור הדם, אשר ידועות כקשורות ללחץ.

הבודקים הגיעו למסקנה שממצאים אלו מוסברים בצורה הטובה ביותר על ידי ההשפעות הפסיכולוגיות של אובדן הריון, התורמות לרמות גבוהות של מתח, שימוש בסמים, לקיחת סיכונים והתנהגויות הרס עצמי.



איור 2. כל חשיפה להפלה מעלה את הסיכון למוות מוקדם בכ-50%

המחקרים שנסקרו חושפים גם השפעת מינון, כאשר כל חשיפה להפלה מוסיפה סיכון מוגבר של כ-50 אחוז למוות בטרם עת בהשוואה לנשים שמעולם לא עברו הפלות (איור 2).

לעומת זאת, לידה של שני הריונות או יותר משפרת את אורך החיים. לידה קשורה גם להפחתה בסיכוני תמותה הקשורים להפלה או הפלה בלבד.

זיהתה, Sage Open Medicine-הסקירה השיטתית, שפורסמה ב-989 מחקרי מוות אימהי, מתוכם 68 היו באיכות הגבוהה ביותר. מחקרים אלו באיכות גבוהה יותר היו אלה שקישרו בין תעודות פטירה לרשומות רפואיות אחרות כדי לזהות את תוצאות ההריון האחרונות. מכיוון שלעתים קרובות אין בתעודות פטירה מידע על הריונות אחרונים, מחקרים המבוססים על תעודות פטירה בלבד הוכחו כלא שלמים כידוע.

מתוך 68 מחקרי הצמדת רשומות באיכות גבוהה יותר שזוהו על ידי צוות המחקר, רק 11 סיפקו תוצאות כדי לאפשר השוואה בין שיעורי התמותה הקשורים לתוצאות הריון שונות: לידה, הפלה, הפלה או אבדן טבעי אחר.

## האם הייתה כיסוי מכוון?

לדברי המחבר הראשי של הסקירה, ד"ר דיוויד רירדון, הסיכון המוגבר למוות בעקבות אובדן הריון (הפלה או הפלה) זוהה לראשונה במחקר על כלל אוכלוסיית הנשים בפינלנד בשנת 1997. רירדון הוא מנהל מכון אליוט, קבוצת מחקר המתמקדת בנושאי בריאות הרבייה

רירדון אמר שרוב מחקרי ההצמדה הרשומים שפורסמו מאז 1997 יכלו וצריכים היה לחקור את ההבדלים בשיעורי התמותה של האם ביחס לאובדן הריון. אבל רוב החוקרים בחרו לדווח רק על מקרי מוות הקשורים ללידה.

קשה להאמין שמומחי תמותת אמהות אלו אינם מודעים לאחדות" הנפש של 11 מחקרי האוכלוסיה הגדולים מפינלנד, דנמרק וארה"ב ביחס לסיכון מוגבר למוות בעקבות אובדן רבייה", אמר.

רירדון מאמין שהמחסור בנתונים נוספים על מקרי מוות בעקבות אובדן הריון נובע ככל הנראה מהטיה נגד פרסום תוצאות שעלולות לערער את המאמצים הבינלאומיים לקדם גישה להפלות במדינות פחות מפותחות.

כדוגמה לדיווח סלקטיבי, רירדון ציטט מחקר מקיף של קישור רשומות מאיטליה, שבו הכותבים ציינו שהם זיהו מקרי מוות הקשורים להפלה והפלה יזומה. עם זאת, המחברים סירבו לאחר מכן לפרסם נתונים המאפשרים השוואה בין שיעורי התמותה של אימהות ביחס לנשים לידה או לעולם לא בהריון לבין אלו שעברו הפלה או הפלה.

רירדון אמר גם שהעובדה שכל מחקרי ההצמדה הרשומים מגלים שיעורי תמותה גבוהים יותר בעקבות הפלה סותרת ישירות את הקביעה שהפלה "בטוחה" פי עשרה עד 15 מלידה.

הטענה הזו תמיד התבססה על השוואת נתונים חלקיים מתעודות" פטירה למספר חלקי עוד יותר של מקרי מוות שדווחו מרצון על ידי ספקי הפלות", אמר. "זה מדע זבל פנימה, זבל החוצה. רק מחקרי קישור רשומות מספקים נתונים מוצקים. רק מחקרי קישור רשומות מספקים סטנדרט משותף לעריכת השוואות."