



# AfterAbortion.org

המאמר המקורי באנגלית בכתובת  
<https://www.afterabortion.org/teen-abortion-risks-a-medical-fact-sheet/>

## סיכונים להפלות בני נוער: גיליון מידע רפואי

**בני נוער עומדים בסיכון גבוה יותר לסבול מסיבוכים הקשורים להפלות. זה נכון לגבי סיכונים פיזיים ורגשיים כאחד, כולל סיבוכים מיידיים, קצרי טווח וארוכי טווח.**

להלן רשימה של הממצאים של מחקרים רפואיים רלוונטיים עבור **לנסות להתאבד אם הם עברו 6 מתבגרים: בני נוער נוטים פי הפלה בששת החודשים האחרונים** מאשר בני נוער שלא עברו הפלה, 1 ופי 4 יותר סיכוי להתאבד מאשר מבוגרים שמפילים..2

היסטוריה של הפלה עשויה להיות קשורה לחשיבה אובדנית של מתבגרים.1 בסך הכל, לנשים שעברו הפלות יש 6 שיעור גבוה פי שניים של התאבדות בהשוואה לנשים שנושאים לקדנציה.3

- **כ-40% מההפלות של בני נוער מתרחשות ללא מעורבות הורים, 6 השארת הורים בחושך לגבי בעיות רגשיות או פיזיות עוקבות ומעמידה אותם בסיכון לפציעה ולמוות נוספים7**
  - **בני נוער נוטים פי 5 לבקש עזרה לאחר מכן לבעיות פסיכולוגיות ורגשיות בהשוואה לבני גילם שנושאים "הריונות לא רצויים" עד תום.8**
  - **לבני נוער יש סיכוי גבוה פי 3 לדווח על בעיות שינה עוקבות, ופי תשעה יותר לדווח על שימוש נוסף במריחואנה לאחר הפלה.**
  - **בין מחקרים שהשוו הפלה לעומת ביצוע לידה, תוצאות גרועות יותר קשורות להפלה, גם כשההריון לא מתוכנן.8**
  - **בני נוער נוטים יותר להפיל בגלל לחץ מהוריהם או בן זוגם.9 במחקר אחד, 64% מהנשים שעברו הפלה דיווחו שהן מרגישות לחץ על ידי אחרים להפיל.10**
- בני נוער נוטים יותר לדווח על מידע מוטעה בייעוץ לפני הפלה.11**

## כאב חד. אי פוריות. סכנת מוות



- **כאב חד.** בני נוער מדווחים על כאבים חזקים יותר במהלך הליך ההפלה מאשר נשים בוגרות.12
- **חתכים עד פי שניים יותר.** בני נוער מתמודדים עם סיכון כפול לפצעים בצוואר הרחם במהלך הפלה בהשוואה לנשים מבוגרות.13
- **אי פוריות וסיבוכים מסכני חיים.** מחקרים מצאו כי מתבגרים נמצאים בסיכון גבוה יותר לזיהומים ודלקת (PID) לאחר הפלה כגון מחלת אגן דלקתית רירית הרחם.14 זיהומים אלו מגבירים את הסיכון שלהם לאי פוריות, כריתת רחם, הריון חוץ רחמי וסיבוכים חמורים אחרים.15

- סיכון גבוה יותר לסרטן השד לבני נוער.** לידה מוקדמת מלאה מפחיתה את הסיכון לסרטן השד ב-1/3, בעוד שהפלה של הריון ראשון נושאת סיכון מוגבר של 30-50% לסרטן השד. 16 יותר מ-90% מאלה שמפילות בגיל 17 ומטה. לא היה להם הריון מלא קודם, בהשוואה ל-78% מהמטופלים בגילאי 18-19 ו-49% מחולי הפלות בסך הכל. 17.
- בני נוער נוטים יותר לעבור הפלות מאוחרות יותר.** כ-30% מההפלות בקרב בני נוער, CDC-לפי ה מתרחשות בשבוע ה-13 להריון ומעלה, בהשוואה ל-12% בלבד בקרב נשים באופן כללי. 18. הפלות מאוחרות קשורות לבעיות פסיכולוגיות חמורות יותר, 19 סיכון גבוה יותר לסיבוכים גופניים. 20, ובעיות בהריונות מאוחרים יותר. 21.

## אבל, טראומה ותוצאות הרס עצמי

- בני נוער המפילים נוטים פי שניים מבני גילם**
- להתעלל באלכוהול, מריחואנה או קוקאין. 22**
- לבני נוער יש סיכון גבוה יותר לקושי להתמודד** לאחר הפלה, 23 מה שמוביל לבעיות כמו התאבדות, בעיות פסיכולוגיות, שימוש בסמים וקושי במערכות יחסים.

- **השפעות שליליות על מערכות יחסים והורות.** מתבגרים המדווחים על "אוהבים במיוחד ילדים" אינם מצליחים פסיכולוגית לאחר הפלה. 24 לבני נוער שעוברים הפלות יש לעתים קרובות בעיות מאוחרות יותר בנוגע למיניות והורות. 25
- **חוויה בודדה, טראומטית.** הליך ההפלה עצמו נחשב בעיני בני נוער רבים למלחיץ ומזוהה עם רגשות אשמה, דיכאון ותחושת בידוד. 26
- **סיוט שלא נגמר.** בני נוער נוטים יותר לדווח על סיוטים קשים ולציון גבוה יותר בסולם המודדים תכונות אנטי-חברתיות, פרנויה, שימוש בסמים ואשליות פסיכוטיות מאשר חולי הפלות מבוגרים. 27
- **סיכון גבוה פי ארבעה להפלה חוזרת.** סביר להניח שבני נוער שיפילו יכנסו להריון שוב במהלך השנים הקרובות. 28 בקרב בני נוער בהריון, אלו שעברו הפלה היו בסיכון גבוה לפחות פי 4 להפיל. 29